

暴露事件反应

经皮肤的损伤:

- ✓ 处理受影响的区域:
- ✓ 用消毒剂或杀菌肥皂和水彻底清洗 15 分钟 (碘酒是首选的)
- ✓ 挤压受影响的区域周边以促进血液 外排

飞溅到脸上:

- ✓ 用洗眼装置冲洗受影响的区域 15 分钟

浮质暴露:

- ✓ 摒住呼吸并立即撤离房间
- ✓ 小心地脱去身体保护装置 : 将暴露 区域内翻
- ✓ 用肥皂和水彻底清洗双手
- ✓ 张贴溅 (溢) 出标志 , 实验室至少 需要疏散 30 分钟。首席研究员负 责取消实验室的再进入警告。

注意: 如果事件中有浮质产生 (例如发生在生物安全操作台外的溅 (溢) 出) 应迅速撤离实验室并在一个安全场所实施应对程序。在开始工作前应事先确定 一个撤离场所。

- ✓ 通告首席研究员或导师 (如果存在) 开始事故或暴露事件报告。 (首席研究员或导师必须拨打 785-3555 通告环境卫生与安全办公室)
- ✓ 立即寻求医疗援助 (大学健康服务紧急监护) 请同事事先拨打健康服务机构电话 (432-0123) .